

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA DE ENFERMERÍA



Factores para el abandono de la lactancia materna exclusiva: revisión bibliográfica

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN ENFERMERÍA

AUTOR

Maria Flor De La Cruz Sanchez

ASESOR

Elaine Lazaro Alcantara

<https://orcid.org/0000-0002-7705-626X>

Chiclayo, 2019

Índice

Resumen.....	3
Abstract.....	4
Introducción	5
Referencias bibliográficas.....	14
Anexos	17

Resumen

Objetivo: describir los factores para el abandono de la lactancia materna exclusiva. **Método:** Investigación bibliográfica, de tipo descriptivo realizada en el buscador Google Académico y a BVS enfermería, Pubmed y Scielo. Para la indagación, se usaron las palabras clave, descriptores y operadores boléanos “AND” y “OR”. Se seleccionaron investigaciones que contengan al objeto de estudio; los artículos seleccionados fueron investigaciones originales, a texto completo. **Resultados:** Luego de comprobar su validez de los artículos seleccionados; se obtuvo 15 artículos; los cuales fueron clasificados según las categorías que se identificaron en la lectura y análisis: edad de la madre, grado de instrucción, percepción de la leche producida y ocupación e ingreso económico. **Conclusión:** Tras la investigación realizada, se infiere, que el abandono de la LME, es un problema de salud pública a nivel mundial, que afectan a los niños hasta los 6 meses de edad; son diversos los condicionantes para que las madres abandonen la LME, los mismos que se pueden evitar. El riesgo que produce el abandono de la LM, es un indicador que puede ser corregido a toda costa en cualquier institución hospitalaria de cualquier nivel, cuya misión es asegurar el bienestar de los niños para que no sufra de enfermedades que se pueden prevenir.

Descriptores: Lactancia materna (D001942)

Palabras Clave: Factores, abandono.

Abstract

Objective: to describe the factors for the abandonment of exclusive breastfeeding. Method: Bibliographic research, of a descriptive type, carried out in the Academic Google search engine and Nursing VHL, Pubmed and Scielo. For the inquiry, the keywords, descriptors and Boolean operators "AND" and "OR" were used. Investigations containing the object of study were selected; the selected articles were original research, full text. Results: After checking the validity of the selected articles; 15 articles were obtained; which were classified according to the categories identified in the reading and analysis: mother's age, educational level, perception of the milk produced and occupation and economic income. Conclusion: After the research carried out, it is inferred that the abandonment of EBF is a public health problem worldwide, affecting children up to 6 months of age; There are several conditions for mothers to abandon EBF, the same that can be avoided. The risk that the abandonment of BF produces is an indicator that can be corrected at all costs in any hospital institution of any level, whose mission is to ensure the well-being of children so that they do not suffer from diseases that can be prevented.

Descriptors: Breastfeeding (D001942)

Keywords: Factors, abandonment.

Introducción

La lactancia materna (LM) es un proceso biológico natural para que las mujeres alimenten a sus hijos¹, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Española de Pediatría (AEP) sugiere de manera exclusiva (LME) los seis primeros meses y continuar hasta los dos años de forma complementaria^{2,3}. La LM tiene beneficios como: prevenir enfermedades diarreicas agudas (EDA), infecciones respiratorias agudas (IRA) y reduce la morbimortalidad infantil^{1,4}; por otro lado tiene ventajas para la madre: prevenir cáncer de mama y ovario^{1,5}.

Diversos estudios confirman que la leche materna cubre todas las necesidades nutricionales del bebé⁶ este alimento contiene agua, proteínas, grasas, hidratos de carbono, etc. y esto permite al niño alcanzar un crecimiento y desarrollo adecuado⁷. Por otro lado, la leche materna tiene diferentes etapas: calostro; se caracteriza por el color amarillento y contiene mayor concentración de IgA, Lactoferrina, linfocitos y la leche de transición contiene vitaminas hidrosolubles, lactosa, grasas y en esta etapa se disminuye las proteínas y vitaminas liposolubles^{8,3}.

La Ley N°27240 dispone licencia por lactancia materna, las madres que tenga niños menores de 12 meses contarán con un permiso diario de una hora para dar de lactar⁹; a pesar de la normatividad, las madres no cuentan con este beneficio y como consecuencia se ha incrementado del abandono de la LM¹⁰.

La Segunda Guerra Mundial dejó como consecuencia el abandono de la LM de manera progresiva¹¹ en nuestra realidad existen mitos, costumbres y factores condicionantes que favorecen el abandono e incumplimiento de la LM¹².

Actualmente se viene realizando campañas de promoción de LM y se ha logrado un incremento gradual pero aún no se logra llegar a los niveles recomendados por la OMS, por lo cual se recomienda buscar nuevas estrategias, apoyo y monitorización de la LM^{13,14}.

Por ello, la presente revisión bibliográfica plantea un estudio sobre el estado actual del conocimiento del abandono de la LME, que aumenta la tasa enfermedades como: EDA,

IRA y la morbilidad y mortalidad infantil. Durante el primer semestre del 2019, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reporta que solo el 64.0% de niños reciben lactancia exclusiva, es mayor en el área rural 78.2% y la urbana 57.4%¹⁵; durante el 2018 se presentó una LME de 67.9%¹⁶ por lo cual se ve una disminución de 3.9%. Al describir los factores para el abandono de la LME, servirá como una base para mejorar las estrategias que el personal de salud debe implementar para su cumplimiento de forma exclusiva.

El propósito de la presente revisión bibliográfica es describir los factores para el abandono de la LME; por consiguiente, con la indagación de diversos artículos científicos se busca dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los factores para el abandono de la lactancia materna exclusiva?

Metodología

Tipo de estudio:

El presente estudio es bibliográfico, tipo descriptiva¹⁷, que permitió recopilar, identificar, seleccionar, analizar e interpretar el total de los documentos, con el propósito de describir el estado actual sobre los factores para el abandono de la LM.

Método de búsqueda:

La indagación bibliográfica se realizó entre los meses mayo, junio y julio del 2020, por el cual se accedió a las bases de datos: BVS enfermería, Pubmed, Scielo y el motor de búsqueda Google académico. En primer lugar, se hizo una búsqueda básica, por medio de dos títulos “factores que afectan lactancia materna” y “abandono de la lactancia materna”. Enseguida se hizo búsqueda avanzada, utilizando la estrategia de búsqueda con operadores booleanos “AND” y “OR”, palabras claves y los descriptores: lactancia materna AND factores, lactancia materna AND abandono; lactancia materna OR abandono. Breastfeeding AND factors.

Criterios de Selección de los estudios:

Se incluyeron artículos originales con el objeto de estudio, a texto completo, de acceso gratuito; fecha de publicación desde el 2011 hasta 2020 y en los idiomas de inglés y español. Se excluyeron los artículos duplicados en distintas bases de datos.

Selección de artículos

En primera instancia se seleccionaron los artículos relacionados al objeto de estudio. Se obtuvo un total de 14670 investigaciones considerando la palabra claves y sus sinónimos. Luego se seleccionaron 74 artículos aplicando los criterios de selección. Finalmente bajo los criterios de validación y utilidad de Gálvez¹⁸, se optó por 15 artículos: Scielo (6), Pubmed (1), Google Académico (6) y BVS Enfermería (2).(ver cuadro N°1).

Cuadro N° 01: Registro de búsqueda bibliográfica

Fuentes consultadas	Número de artículos encontrados	Número de artículos seleccionados con los criterios de selección	Número de artículos seleccionados con criterios de calidad
Google Académico	14300	28	6
BVS enfermería	29	8	2
Scielo	40	28	6
Pubmed	301	10	1
Total	14670	74	15

Fuente: Tomado de Burns y Grove Investigación en Enfermería y modificado por las docentes de la asignatura de Seminario de Enfoques Emergentes de la Investigación Cualitativa en Salud

A continuación, se presenta el listado de artículos seleccionados (ver cuadro N°2)

Cuadro N° 02: Título, autores, revista y año de publicación de artículos analizados

Título del artículo	Autores	Fuente consultada	Año
Factores que influyen en el abandono precoz de la lactancia materna.	Yaliesky Morales Valdés, Lareisy Borges Damas, Yoanca Algozain Acosta	Rev. Cubana de Enfermería	2015
Características y creencias maternas asociadas al abandono de la lactancia materna exclusiva.	Melisa Pamela Quispe, Alfredo Enrique Oyola García, Marilia Navarro Cancio, José Antonio Silva Mancilla.	Rev. Cubana de Salud Pública	2015
El entorno familiar y social de la madre como factor que promueve o dificulta la lactancia materna.	Fabiola Becerra Bulla, Libertad Rocha Calderón, Dayana Milena Fonseca Silva, Laura Andrea Bermúdez Gordillo.	Rev. Fac. Med. Colombiana	2015
Factores asociados con la lactancia materna exclusiva	María Marlen Avalos Gonzales, Eida Rosa Mariño Membrides, Jose Antonio Gonzales Hidalgo.	Rev. Cubana de Medicina General	2016
Lactancia materna exclusiva y factores asociados en madres que asisten a establecimientos de salud de lima centro.	Carmen Villareal Verde, Maritza Dorila Placencia Medina, Violeta Alicia Nolberto Sifuentes.	Rev. Fac. Med. Hum	2020
Factores de riesgo que influyen en el abandono de la lactancia materna. 2017-2018.	Yumeri Rosada Navarro, Wilmar Delgado Medina, Madeline Yoanis Meireles Ochoa, Liliam Ines Figueredo Gonzales, Alina Barrios García	Multimed	2019
Factores determinantes de la lactancia materna exclusiva:	Emilio Rivera Ledesma, Lester Bauta Leon,	Rev. Habanera de Ciencias Medicas	2017

Policlínico “Aleida Fernández”. 2015	Aliusca Fornaris Hernandez, Milagros Flores Martinez, Rachel Perez Majendie		
Tipos de lactancia materna y factores que influyen en su abandono hasta los 6 meses. Estudio LACTEM	Rosa Cabedo, Josep Manresa, Victoria Cambredo, Laura Montero, Azahara Reyes, Roser Gol, Gemma Falguera	Matronas Profesión	2019
Prevalencia y factores asociados con la duración de la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses en la cohorte INMA de Guipúzcoa.	Madelen Oribe, Aitana Lertxundi, Mikel Basterrechea, Haizea Begiristain Loreto Santa Marina, Maria Villar, Miren Dorrnsoro, Pilar Amiano, Jesús Ibarluzea	Gaceta Sanitaria	2015
Factores que influyen en la disminución de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida: revisión temática y contexto en Chile	Salome Valenzuela Galleguillo, Estefany Vásquez Pinto, Pablo Gálvez Ortega	Rev. Int Materno Fetal	2016
Factores que influyen en el abandono de la lactancia materna en un programa de apoyo para la misma en el hospital de la mujer en Morelia, Michoacán, en el periodo de septiembre a noviembre 2014	Jacobo Nevedy, Luisa Estefania Garcia Rojas Vasquez, Diana Yolanda Reyes Barretero, Luis Alfredo Trujano Ramos	Nutrición hospitalaria	2015
Factores asociados a la lactancia materna exclusiva	Rosa Niño M, Gioconda Silva, Eduardo Atalah	Rev. Chil Pediatr	2012
Factores maternos que intervienen en la interrupción de la lactancia materna exclusiva en un hospital público	María Juy Mori Rusbell Toralva Aranda, Bernardo Damaso Mata, Marcos Lujan Pachas, Dilmer Dueñas Carbajl.	Rev. De Investigación en Salud	2017
Prevalence of breastfeeding and factors associated with the start and duration of exclusive	María D. Ramiro Gonzales, Honorato Ortiz Marrón,	Anales de pediatría	2018

breastfeeding in the Community of Madrid among participants in the ELOIN	Celina Arana Cañedo-Arguelles, María Jesús Esparza Olcina, Olga Cortes Rico, María Terol Claramonte, María Ordobas Gavin		
Factores culturales y sociales asociados a la lactancia materna exclusiva en San Basilio de Palenque	Rossana López sáleme, Maria Katherine Covilla Pedrozo, Natalia Isabel Morelo Castro, Lisith Paola Morelos Garivia	Duazary	2019

Fuente: Elaborado por docentes de la asignatura de Seminario de Enfoques Emergentes de la Investigación Cualitativa en Salud

Resultados y discusión

Un rol fundamental de los profesionales de salud y con mayor énfasis de la Enfermera es promocionar la LM e intervenir para mantenerla el tiempo recomendado por las organizaciones mundiales¹⁹.

El abandono de LM es un problema mundial, que afecta directamente a los niños menores de 6 meses y de manera indirecta a las instituciones hospitalarias por el incremento de niños con EDA, IRA; lo cual se podría reducir en gran porcentaje si se cumpliera con la LM.

El abandono de la LM, es mayor porcentaje se estudia cuantitativamente según la revisión realizada, recomendaría realizar estudios cualitativos para ver la subjetividad de los sujetos involucrados en el problema.

En el transcurso de la investigación bibliográfica se seleccionaron 15 artículos del cual se formaron cuatro categorías.

a) Edad de la madre

En los artículos seleccionados el 90% de autores menciona que la edad es una causa predisponente para la deserción de la LM, los estudios mencionan a madres entre las edades de 15 a 20 años brindaron una LM del 25.5%; de 25 a 29 años el 29.7% y de 30 a 34 años fueron 31.2% en estos porcentajes brindaron LM a sus hijos por 6 meses^{4,20,21}. Sin embargo, otra investigación refiere que las madres entre las edades de 20 a 35 años abandonan la LM en 81.4%¹.

Según otros resultados, se observó que la edad materna y el abandono se relacionan, fue más común de las personas menores de 20 años con 42.8%, el otro grupo de 20 a 24 años fue del 42.7%⁵; por otra parte, Niño, Silva y Atalah nos manifiesta que la madre con menor edad se reduce el tiempo de LM⁷.

La edad se encuentra relacionado al retiro de la LM, este problema se puede ver en mayor porcentaje en las madres adolescentes y esto puede ser por la inexperiencia del amamantamiento, técnica correcta; sin embargo, en las madres adultas es más duradero el tiempo de LM y se puede asociar a la experiencia previa y madurez^{12,1}.

b) Grado de instrucción

Este factor se encuentra en un debate a nivel mundial y nacional, algunos estudios revelan que las madres sin educación abandonan la LM²², sin embargo otras investigaciones revelan que aquellas madres con menos nivel educativo tuvieron mayor prevalencia de la LM y las madres con educación superior lo abandonaron a los meses, y esto se debe a sus ocupaciones o responsabilidades con la familia, comunidad y sociedad^{20,23}.

Del mismo modo, Villareal, Plasencia y Nolberto en su estudio nos revelan que las madres con secundaria brindan LM en un 58.6%, mientras que las madres con nivel superior abandonan la LM en un 36.4%¹. Por otro lado, se evaluó el nivel de instrucción y se encontró que las madres con nivel secundario y universitario con 46% y 56.7 abandonaron la LM respectivamente⁵.

Distintas investigaciones, determinan que la escolaridad determina el tiempo de LM y esto se presenta mayor en la preparatoria y secundaria con un 59%¹⁰, las madres que cursaron solo el nivel primario y secundario en un 32% y el nivel técnico y superior en un 68%¹⁴.

En nuestra realidad nacional, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) en el 2017²⁴ los niños con madres sin educación o educación primaria son los que tenían mayor acceso a la LM, por otro lado, los índices más bajo de LM son en madres que tuvieron educación superior.

Sin embargo, se entiende que el nivel de educación permite a las personas que están mejor preparadas a tener mejor comprensión de la información.

c) Percepción de la leche producida

La producción insuficiente de leche es el tercer factor más predisponente para el abandono de la LM, según estudios realizados a nivel mundial^{13,25} y esto se relaciona que el bebé deje de mamar, porque la madre tiene escasa leche y no satisface sus necesidades. Otros autores nos mencionan que en 56.3% de madres que abandonaron la LM, se debe a la hipogalactia y 21.9% son problemas del pezón⁴.

Por otra parte, la deserción de la LM es la decisión de la madre porque siente que él bebe no se llena y tiene poca leche⁵; Cabedo⁶ nos muestra en sus resultados que las causas más comunes para la renuncia a la LM son en un 35% por la sensación que el lactante no se llenaba y el 22.8% por la apreciación de hipogalactia⁶.

Existen diferentes causas que ocasionan que las madres brinden menor cantidad la leche materna: una de ellas es prolongar el comienzo de la LM, no dar de mamar el tiempo suficiente. Las madres adolescentes prologan el comienzo de la LM “es normal escuchar a jóvenes decir que deben continuar sus estudios, que si dan de lactar malograrán sus bustos entre otras expresiones y en realidad demuestran el desconocimiento”²⁶.

d) Ocupación e ingreso económico

Diferentes investigaciones tienen como resultado: las mujeres mencionan que abandonaron la LM por la incorporación a su trabajo el 25%¹³, contrastando con otra investigación reporta que las madres trabajadoras son uno de los principales motivos de la deserción de la LM, porque no cuentan con normas vigentes para proteger la LM¹⁰, por otro lado, una indagación menciona que trabajar y especialmente fuera de la casa, es una

causa del abandono de LM, y reemplazarlo con fórmulas lácteas y un incremento en el uso de biberón¹¹.

Otras investigaciones nos muestran que las amas de casa abandonan la LM en un 26.3%¹⁰, comparando con otra investigación llegan a los mismos resultados, el 40% que abandona la LM son trabajadoras del hogar y el 36% trabajan fuera del hogar¹⁴.

En el siglo XXI, cada vez más son las que ingresan al mundo del trabajo, y los ámbitos laborales no cumplen la normativa que protege la LM, esto permite a las mujeres amamantar a sus bebés con calma. Las madres trabajadoras son las que tienen los índices más altos del abandono de LM y como tienen mayor ingreso económico les permite adquirir fórmulas lácteas, el cual no contiene los mismos beneficios de la leche materna^{12,13}.

Conclusiones

En conclusión, se encontraron 4 factores principales que generan el abandono de la LME: edad de la madre, dentro de esta categoría las madres adolescentes fueron la de los porcentajes más altos de la deserción de la LM; grado de instrucción, es una causa que no se encuentra definida porque en algunos estudios revelan que las madres sin educación son las que no abandonan la LM y las madres que tienen educación superior son las que dejan la LM; percepción de la leche producida, varias madres dejar de amamantar a sus bebés porque perciben que no tiene la cantidad necesaria de leche que necesita su niño y ocupación e ingreso económico, este factor es relevante porque permite a las madres adquirir fórmulas lácteas, sin embargo los centros laborales no cumplen con la ley que amparan a las madres y por consecuencia se da la deserción de la LM.

Las causas se pueden cambiar o evitar, esto se logra con una buena planificación institucional, dentro de las actividades de la institución se recomienda: la capacitación al personal de salud sobre la importancia de la LM, de manera exclusiva dentro de los 6 primeros meses para dar cumplimiento a lo que recomiendan las organizaciones mundiales.

Referencias bibliográficas.

1. Villarreal C, Placencia D, Nolberto V. Lactancia materna exclusiva y factores asociados en madres que asisten a establecimientos de salud de lima centro. Rev. Fac. Med. Hum. [Internet]. 2020 abr [citado 2020 Ago 11]; 20(2): 287-294.
Disponible en: <https://url2.cl/JiD7b>
2. Organización Mundial de la Salud. Semana de la Lactancia materna. [Internet]. [citado 2020 Jul 14].
Disponible en: <https://url2.cl/jyInr>
3. Asociación Española de Pediatría. Semana de la Lactancia Materna. [Internet]. [citado 2020 Jul 14].
Disponible en: <https://url2.cl/NbL9i>
4. Morales y, Borges L, Algozain Y. Factores que influyen en el abandono precoz de la lactancia materna. Rev. Cubana Enfermería. [Internet]. 2015 jun [citado 2020 Ago 08]; 31(2).
Disponible en: <https://url2.cl/pjzym>
5. Rosada Y, Delgado W, Meireles M, Figueredo L, Barrios A. Factores de riesgo que influyen en el abandono de la Lactancia Materna. 2017-2018. Multimed [Internet]. 2019 Dic [citado 2020 Ago 08]; 23(6): 1278-1293.
Disponible en: <https://url2.cl/RvBGA>
6. Cabedo R, Manresa J, Cambredo M, Montero L, Reyes A, et al. Tipos de lactancia materna y factores que influyen en el abandono hasta los 6 meses. Estudio LACTEM. Matronas Prof. [Internet]. 2019 [citado 2020 Ago 08]; 20(2): 54-61.
Disponible en: <https://url2.cl/bGnfM>
7. Niño R, Silva G, Atalah E. Factores asociados a la lactancia materna exclusiva. Rev. Chil. Pediatría. [Internet]. 2012 abr [citado 2020 Ago 07]; 83(2): 161-169.
Disponible en: <https://url2.cl/H3aYK>
8. Sabillon F, Abdu B. Composición de la leche materna. [Internet]. [citado 2020 Ago 07].
Disponible en: <https://url2.cl/QKfwj>
9. Permiso por lactancia materna Ley N°27240 [Per]. Art 1. enero 20 de 2001 (Perú).
Disponible en: <https://url2.cl/KZaQc>
10. Méndez N, García L, Reyes D, Trujano L. Factores que influyen en el abandono de la lactancia materna en un programa de apoyo para la misma en el Hospital de la mujer en

Morelia, Michoacán, en el periodo de septiembre a noviembre del 2014. Nutr. Hosp. [Internet]. 2015 Dic [citado 2020 Ago 07]; 32(6): 2618-2621.

Disponible en: <https://url2.cl/waAiy>

11. Becerra F, Rocha L, Fonseca D, Bermudez L. El entorno familiar y social de la madre como factor que promueve o dificulta la lactancia materna. Rev. Fac. Med. [Internet]. 2015 abr [citado 2020 Ago 07]; 63(2): 217-227.

Disponible en: <https://url2.cl/JBqGU>

12. Valenzuela S, Vásquez E, Gálvez P. Factores que influyen en la disminución de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida: revisión temática y contexto en Chile. Rev. Int. Salud Materno [Internet]. 2016 [Citado 2020 Ago 09] Disponible en:

<https://url2.cl/g4Sue>

13. Ramiro M, Ortiz H, Cañedo C, Esparza M, Cortez O, et al. Prevalence of breastfeeding and factors associated with the start and duration of exclusive breastfeeding in the Community of Madrid among participants in the ELOIN. Rev. An. Pediatr [Internet]. 2018 [Citado 2020 Ago 09]; 89(1): 32-43.

Disponible en: <https://url2.cl/WDx4I>

14. López R, Covilla M, Morelo N, Morelos L. Factores culturales y sociales asociados a la lactancia materna exclusiva en San Basilio de Palenque. Duazary [Internet]. 2019 [citado 2020 11 Ago 08]; 16(2):293 -306.

Disponible en: <https://url2.cl/2FxDF>

15. Instituto nacional de estadística e informática. Perú: Indicadores de resultados de los programas presupuestales, primer semestre 2019. [Internet]. 2019; [citado 2020 Ago 13]; 151 p.

Disponible en: <https://url2.cl/DAUVv>

16. Instituto nacional de estadística e informática. Perú: Indicadores de resultados de los programas presupuestales, primer semestre 2018. [Internet]. 2018; [citado 2020 Ago 13]; 151 p.

Disponible en: <https://url2.cl/aA51Q>

17. Berenguera A, De Sanmamed J, Pons M, Pujol E, Rodríguez D, Saura S. Escuchar, observar y comprender: Recuperando la narrativa en las Ciencias de la Salud. Aportaciones de la investigación cualitativa. Barcelona: Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP J. Gol); 2014. 224p.

18. Gálvez A. Enfermería Basada en la Evidencia. Cómo incorporar la Investigación a la Práctica de los Cuidados [Internet]. Granada: Fundación Index; 2001 [Citado 2020 Ago 12].
Disponible en: <https://url2.cl/LAua4>
19. Órgano de expresión de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria. Lactancia Materna: ventajas, técnicas y problemas. Rev. Pediatría Integral. [Internet].2015 [Citado 2020 Ago 08].
Disponible en: <https://url2.cl/vQXg4>
20. Quispe M, Oyola A, Navarro M, Silva J. Características y creencias maternas asociadas al abandono de la lactancia materna exclusiva. Rev. Cubana Salud Pública [Internet]. 2015 [citado 2020 Ago 08]; 41(4).
Disponible en: <https://url2.cl/sTJvP>
21. Rivera E, Bauta Le, Fornaris A, Flores M, Pérez R. Factores determinantes de la lactancia materna exclusiva: Policlínico "Aleida Fernández". 2015. Rev. Haban Cienc Méd. [Internet]. 2017 [citado 2020 Ago 09] ;16(6): 879-890
Disponible en: <https://url2.cl/cNh1v>
22. Avalos M, Mariño E, González J. Factores asociados con la lactancia materna exclusiva. Rev. Cubana Med. Gen. Integra. [Internet].2016 [Citado 2020 Ago 08].
Disponible en: <https://url2.cl/KTxS7>
23. Oribe L, Basterrechea M, Begiristain H, Santa Marina L, Villar M, et al. Prevalencia y factores asociados con la duración de la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses en la cohorte INMA de Guipúzcoa. Gac Sanit. [Internet]. 2015 [citado 2020 Ago 08]; 29(1): 4-9.
Disponible en: <https://url2.cl/6hidY>
24. Encuesta demográfica y Salud Familiar. [Internet]. 2017. [citado 2020 Ago 09]
Disponible en: <https://url2.cl/87fnZ>
25. Mori J, Toralva A, Damaso B, Lujan M, Dueñas D. Factores maternos que intervienen en la interrupción de la lactancia materna exclusiva en un hospital público. Rev. Per de Investigación en Salud.
Disponible en: <https://url2.cl/SCMP5>
26. Matos C, Gómez Y, Martínez N, Garrido D, Arguelles J. Enfoque terapéutico desde la Medicina Natural y Tradicional para la hipogalactia materna. Rev. Inf Cient [Internet]. 2018 [citado 2020 Ago 10];97(2).
Disponible en: <https://url2.cl/2SHGP>

Anexo N°2: Informe Turnitin

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

INFORME DE ORIGINALIDAD

23%	22%	8%	17%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	libmast.utm.my Fuente de Internet	2%
2	lawwww.redalyc.org Fuente de Internet	2%
3	www.analesdepediatria.org Fuente de Internet	2%
4	repositorio.uchile.cl Fuente de Internet	1%
5	dialnet.unirioja.es Fuente de Internet	1%
6	2011.www.redalyc.org Fuente de Internet	1%
7	repis.unheval.edu.pe Fuente de Internet	1%
8	revistas.unimagdalena.edu.co Fuente de Internet	1%
9	www.revmultimed.sld.cu Fuente de Internet	1%
10	revistas.urp.edu.pe Fuente de Internet	1%
11	Submitted to Universidad Catolica De Cuenca Trabajo del estudiante	1%
12	pesquisa.bvsalud.org Fuente de Internet	1%
13	repositorio.unsa.edu.pe Fuente de Internet	1%
14	www.revenfermeria.sld.cu Fuente de Internet	1%

15	doczz.es Fuente de Internet	1%
16	eresmama.com Fuente de Internet	1%
17	Submitted to Universidad de Cádiz Trabajo del estudiante	<1%
18	criticamedicina.blogia.com Fuente de Internet	<1%
19	revistas.uta.edu.ec Fuente de Internet	<1%
20	construaprende.com Fuente de Internet	<1%
21	www.mspas.gob.sv	

Fuente de Internet <1%

22	www.grade.org.pe Fuente de Internet	<1%
23	Verónica Guadalupe García-Magdaleno, Jorge Laureano-Eugenio. "Representaciones sociales frente a la lactancia materna en mujeres rurales y urbanas de Jalisco, México: estudio cualitativo", Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, 2019 Publicación	<1%
24	www.scielo.org.pe Fuente de Internet	<1%
25	gacetasanitaria.elsevier.es Fuente de Internet	<1%
26	studylib.es Fuente de Internet	<1%
27	Submitted to Aliat Universidades Trabajo del estudiante	<1%
28	Submitted to Universidad Europea de Madrid Trabajo del estudiante	<1%

29 creativecommons.org
Fuente de Internet <1%